

Grandes Cultures

Service Régional de la Protection des Végétaux Site de Marmilhat BP 45 63370 LEMPDES Tél. 04.73.42.14.83

Tél. 04.73.42.14.83 Fax 04.73.42.16.76 www.srpv-auvergne.com

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de la DRAF AUVERGNE

SOL

est

partielle

reproduction

SPV

0

Le Directeur gérant : D. DIDELOT

Publication périodique C.P.P.A.P n°2315AD ISSN n°1254.6372

Tarifs : Courrier : 55 € Fax : 50 € Internet : 45 €

AVERTISSEMENTS

AGRICOLES®

DLP 13 08-20028000

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

AUVERGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°24 du 25 juillet 2002 – 1 page

> Colza : Penser au faux-semis

> Prochain bulletin le 08 août.

MAÏS

Stade: 15 feuilles à brunissement des soies.

Pyrale

Bilan des captures au 24 juillet 2002 :

semaines	24- 30 juin	1-7 juill et	8-14 juill et	15- 21 juill et	22- 24 juill et
Lempdes	1	0	4	4	0
Pagnant	6	11	12	20	6
St Babel	6	11	17	6	
Bouce	3	0	1	0	0
Etroussat	12	5	18	4	0
Bellenaves	. 0	0	1	0	0
Charmes	3	0	9	3	1
Escurolles	1	4	16	0	0
Isles et Bardais	4	10	27	5	10
St Didier la Forêt	2	4	6	3	0

Observations des pontes :

Comme pour les captures, les pontes sont en nette diminution cette semaine.

Pucerons

A ce stade seules les colonisations de panicules par Rhopalosiphum padi sont à surveiller.

Nos observations montrent de très faibles colonisations.

Rappel du seuil d'intervention : une panicule sur deux colonisée

COLZA

Faux-semis

Le raisonnement du désherbage doit commencer dés la récolte du précèdent. En travaillant le sol dans les 48 heures qui suivent la récolte, vous pouvez bénéficier de l'humidité résiduelle pour réaliser un faux-semis. Les adventices ainsi levées pourront être ainsi détruites par un nouveau déchaumage ou par un herbicide total.

Désherbage chimique

La réussite du désherbage du colza repose sur les grands principes suivants :

- Bien connaître la flore attendue afin de choisir les programmes les plus efficaces,
- Appliquer les produits dans de bonnes conditions (sol frais et incorporation sur 6 à 8 cm de profondeur pour la trifluraline et sur 2 à 3 cm pour la napropamide).

TOURNESOL

Maladies

De rares symptômes de phoma et de phomopsis sont observés dans certaines parcelles. Actuellement, c'est l'albugo (voir bulletin n°22) qui provoque les symptômes les plus impressionnants.

Les pertes de rendement liées aux maladies du tournesol seront encore négligeables cette année.

